

## **انواژیناسیون چقدر متداول است و چه کسانی بیشتر در معرض این عارضه هستند؟**

انواژیناسیون متداولترین عامل مسدود گردیدن روده در نوزادان و کودکان می شود عارضه معمولا در کودکان بین سنین ۵ ماهه تا ۱۵ ماهه اتفاق می افتد.

### **نحوه تشخیص بیماری چگونه است؟**

عموما پزشک معالج با فشار آرام روی شکم می تواند ورم روده را احساس کرده و از طریق آن انواژیناسیون را تشخیص دهد. همچنین از طریق سونوگرافی نیز می توان به این عارضه پی برد.

### **چه عواملی باعث انواژیناسیون می شود؟**

هنوز دلیل این عارضه به طور دقیق مشخص نیست ولی احتمال داده می شود که بعضی از عفونتها عامل ایجاد آن باشد.

### **انواژیناسیون چگونه درمان می شود؟ آیا درمانهای جایگزین نیز وجود دارند؟**

اولین درمان این عارضه استفاده از روش تقیه یا انما است. در این روش از طریق مقعد لوله ای به داخل فرستاده می شود، سپس مایعی به داخل روده رها می گردد. این عمل باعث باز شدن روده شده و در نتیجه مشکل انواژیناسیون حل می شود. اگر این روش موثر واقع گردد، شما قادر خواهید بود بعد از

کودک شما معمولا غذا را برگردانده و استفراغ می کند. در ضمن ممکن است چهره کودک شما کبود گردد.


به دلیل استفراغ، بدن کودک شما ممکن است دچار کم آبی گردیده و در نتیجه آن، کودک دچار خستگی و بی حالی گردد از دیگر علائم این بیماری تب بالا و ورم شکم می باشد.



**مادر عزیز:** در این برگه اطلاعاتی کلی پیرامون بیماری فعلی کودک شما آورده شده است. امیدوارم که با مطالعه آن، به سؤالات شما در زمینه وضعیت کودکان و نحوه مراقبت از او پاسخ داده شود.

### **انواژیناسیون چیست ؟**

انواژیناسیون عبارت است از عارضه فرو رفتن بخشی از روده در خودش.



### **علائم این عارضه چیست ؟**

علامت اصلی این بیماری درد شدیدی است که به صورت متناوب می باشد (یعنی می آید و می رود) هر دوره تناوب از درد، حدود دو یا سه دقیقه طول می کشد. بعد از حدود ۱۱ ساعت یا بیشتر درد حالت ماندگاری بیشتری پیدا می کند و



## انواژیناسیون

در هم رفتگی روده



تهیه کننده : واحد آموزش به بیمار

1398

### بعد از عمل جراحی چه اتفاقی می افتد؟

به مدت ۴۸ ساعت بعد از عمل جراحی، کودک شما از نزدیک تحت نظر خواهد بود. ممکن است کودک به دستگاههایی جهت کنترل وضعیت تنفس، ضربان قلب و اندازه گیری میزان اکسیژن وصل شود. در هنگام جراحی به کودک شما داروهای مسکن داده می شود. در چند روز ابتدایی بعد از جراحی، مسکنها از طریق سرم به بدن کودک انتقال می یابند و سپس وقتی کودک شما راحتتر شد، تا بهبودی نسبی روده، کودک قادر به غذا خوردن نخواهد بود.

### چشم انداز آینده برای کودکی که مبتلا به انواژیناسیون می گردد:

در تعداد بسیار اندکی از کودکان ممکن است این عارضه دوباره بازگردد که در این صورت نیز باید دوباره از روشهای درمانی شامل انما (Enema) یا جراحی استفاده کرد. بعد از جراحی در صورتیکه در کودک خود علائم زیر را مشاهده کردید به پزشک مراجعه کنید

• کودک نمی تواند هیچ گونه مایعی بخورد و یا نشانه هایی از کم آبی در کودک دیده می شود.

• تب کودک بالا رفته است (بیشتر از ۳۸/۵ باشد و پایین نیاید

• ناحیه جراحی شده دارای ترشح باشد.

یک روز کودک را به منزل ببرید. اما در صورت تکرار استفاده از این روش برای کودک شما مفید نباشد ( بنا به تشخیص پزشک) یا اینکه در کاهش عارضه اثر نکند، کودک شما باید تحت عمل جراحی قرار گیرد.



### شرایط و نحوه عمل جراحی چگونه است؟

هنگام عمل جراحی، جراح به آرامی روده را فشار می دهد تا اینکه قسمت داخلی روده که به داخل فرو رفته است بیرون بیاید.

